
Die 3 Karten des Geologischen Landesamtes auf den Folgeseiten stellen die Einstufung des Gebietes Heutingsheim-Süd hinsichtlich Erosionsgefahr, Wasserdurchlässigkeit und geologischer Bewertung dar.


Dabei wird die Gefahr von Bodenerosionen hoch bewertet und die Wasserdurchlässigkeit als gering. Der Boden wird als lößführende Fließerde eingestuft, ein für Ackerbau sehr fruchtbarer Boden.

Die Stadt kann sich ihre Gutachten eigentlich sparen, denn diese hat bereits das Land vor Jahren feststellen lassen. Das Ergebnis ist, dass der Boden für Bebauung wegen hoher Gefährdungen durch Erosion, besonders bei starkem Niederschlag, ungeeignet ist und dadurch auch fruchtbares Ackerland zerstört würde.


Bodenerosionsgefahr



Wasserdurchlässigkeit



Geologie


Baden-Württemberg
REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau
LGRB
LGRBhome
LGRBgeoportal
LGRB-Kartenviewer
LGRBwissen
Ortssuche
Themen/Inhalte
Alle Inhalte
Meine Auswahl
Weinbauatlas: Bearbeitetes Gebiet
Bohrungen
Bohrdatenbank (ADB)
ADB: Bohrungen (Stammdaten)
ADB: Bearbeitetes Gebiet
LGRB-Bohrkernlager
Erdbeben
Geodaten des Landeserdbebendienstes - INSPIRE Dars
Geodaten des Landeserdbebendienstes - INSPIRE Dow
Geologie
GKBW: Geologische Übersichtskarten
Geologische Übersichtskarte 1 : 300 000 (GÜK300)
Geologische Grundkarte 1 : 50 000 (GeoLa GK50)
GK50: Geologische Einheiten (Flächen)
Legende limitieren
GeoLa Geologie: Geologische Einheiten (Flaechen)
Anthropogene Ablagerungen (Aufschüttung, Auffüllung) (qhy)
Anthropogen verändertes Gelände (y)
Verwitterungs-/Umlagerungsbildung (qum)
Lössführende Fließerde (qflL)
Fließerdefolge (qfl)
Weißjura-Hangschutt (quw)
Feuersteinschlufflehm (quf)
Rutschungsbildung (rbg)
Residualton (Tres)
Lösssediment (qlos)
Lösslehm (Lol)
Löss (Lo)
Sandlöß (Los)
Flugsandsediment (qfss)
Lösssand (Flslo)
Mineralisches Seesediment (Fmi)
Organo-mineralisches Seesediment (Fh)
Junge Moorbildung (qht)
Freiberg am Neckar
Heutingsheim
Monrepos-See
Kugelberg